arXiv:0901.2182v2 [math-ph] 10 Feb 2009

EXPOSANTS DE LYAPOUNOV POUR UN MODÈLE D'ANDERSON À VALEURS MATRICIELLES

HAKIM BOUMAZA

RÉSUMÉ. Nous présentons un résultat d'absence de spectre absolument continu dans un intervalle de $\mathbb{R}$ pour un opérateur de Schrödinger aléatoire continu et à valeurs matricielles agissant sur $L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^N$ pour $N \geq 1$ arbitraire. Pour cela nous prouvons l'existence d'un intervalle d'énergies sur lequel a lieu la séparabilité et la stricte positivité des N exposants de Lyapounov positifs de l'opérateur. La méthode suivie, basée sur le formalisme de Fürstenberg et un résultat de théorie des groupes dû à Breuillard et Gelander, permet une construction explicite de l'intervalle d'énergie recherché.

1. Introduction

Pour les modèles d'Anderson dans une bande continue du plan $\mathbb{R}\times[0,1]$, la question de la localisation à toutes les énergies reste une question ouverte. Un tel modèle est représenté par un opérateur aléatoire aux dérivées partielles de la forme $H = -\Delta + V_\omega$ agissant sur $L^2(\mathbb{R}\times[0,1])$ avec conditions de Dirichlet aux bords de la bande, $\mathbb{R}\times\{0\}$ et $\mathbb{R}\times\{1\}$. Le symbole Δ désigne le laplacien continu en dimension 2 et V_ω est une fonction sur $\mathbb{R}\times[0,1]$. Pour étudier l'opérateur H, l'idée est d'opérer une discrétisation dans la direction où la bande est de longueur finie. Cela permet de ramener le problème initial d'équation aux dérivées partielles à l'étude d'un système différentiel ordinaire. Nous étudions donc un opérateur d'Anderson continu, unidimensionnel et à valeurs matricielles de la forme $H_N = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \otimes I_N + V_N(\omega)$ où I_N est la matrice identité de taille $N \geq 1$ et $V_N(\omega)$ une fonction à valeurs dans les matrices symétriques réelles dépendant de paramètres aléatoires. L'objectif est d'obtenir la localisation d'Anderson pour H_N pour tout N puis d'étudier s'il est possible d'obtenir la localisation d'Anderson pour H en considérant la limite lorsque N tend vers l'infini.
Pour prouver la localisation d'Anderson sur un intervalle d'énergies pour un opérateur de la forme de H_N, la première étape est de prouver la séparabilité des exposants de Lyapounov associés à H_N sur cet intervalle, comme cela est fait dans [9] ou [6]. Dans [1] nous avions déjà prouvé, dans le cas $N = 2$, l'existence d'intervalles d'energies sur lesquels les exposants de Lyapounov associés à un opérateur d'Anderson continu à valeurs matricielles étaient séparés. Le but de cet article est de présenter un résultat de séparabilité des exposants de Lyapounov associés à un opérateur H_N pour $N \geq 1$ arbitraire. Pour démontrer un tel résultat, nous aurons recours à un critère de densité de sous-groupes de groupes de Lie semi-simples dû à Breuillard et Gelander ([4]), suivant la même méthode que dans [1]. En effet, la démarche adoptée ici est d'étudier la densité du groupe de Fürstenberg associé à H_N (*i.e* le sous-groupe du groupe symplectique $\mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$ engendré par les matrices de transferts associées à H_N) dans $\mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$. Cela permet d'obtenir aussi la régularité

höldérienne des exposants de Lyapounov et de la densité d'états intégrée de H_N sur tout intervalle compact d'énergie où les exposants de Lyapounov sont séparés (voir [2]). La régularité höldérienne de la densité d'états intégrée de H_N est une étape importante en vue d'appliquer un schéma d'analyse multi-échelle pour prouver la localisation d'Anderson pour H_N (voir [11, 8]).

2. Modèle et résultats

Dans le présent article nous étudions le modèle d'Anderson suivant :

(1)
$$H_\ell(\omega) = -\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\,x^2} \otimes I_{\mathrm{N}} + V_0 + \sum_{n\in\mathbb{Z}} \begin{pmatrix} c_1\omega_1^{(n)}\mathbf{1}_{[0,\ell]}(x-\ell n) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_N\omega_N^{(n)}\mathbf{1}_{[0,\ell]}(x-\ell n) \end{pmatrix}$$

agissant sur $L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^N$. On suppose que $N \geq 1$ est un entier, I_{N} est la matrice identité d'ordre N, chaque c_i est dans $\mathbb{R}^*$ et $\ell > 0$. Pour $i \in \{1,\dots,N\}$, les $(\omega_i^{(n)})_{n\in\mathbb{Z}}$ sont des suites de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathsf{P})$ de loi commune ν telle que $\{0,1\} \subset \mathrm{supp}\,\nu$. Enfin, V_0 est l'opérateur de multiplication par la matrice tridiagonale V_0 ayant une diagonale nulle et tous les coefficients de sa surdiagonale et de sa sous-diagonale égaux à 1. Le paramètre aléatoire ω est une variable aléatoire sur l'espace produit $(\otimes_{n\in\mathbb{Z}}\Omega^{\otimes N}, \otimes_{n\in\mathbb{Z}}\mathcal{A}^{\otimes N}, \otimes_{n\in\mathbb{Z}}\mathsf{P}^{\otimes N})$. On note pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\omega^{(n)} = (\omega_1^{(n)}, \dots, \omega_N^{(n)})$ qui est de loi $\nu^{\otimes N}$. Le paramètre $\ell > 0$ peut être interprété comme une longueur d'interaction. On remarque que $H_\ell(\omega)$ est une perturbation bornée de l'opérateur $-\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\,x^2} \otimes I_{\mathrm{N}}$, il est donc autoadjoint sur l'espace de Sobolev $H^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^N$.
Notre résultat de séparabilité des exposants de Lyapounov de $H_\ell(\omega)$ est le suivant.

Théorème 2.1. *Soit $N \geq 1$. Il existe $\ell_C = \ell_C(N) > 0$ tel que pour tout $\ell < \ell_C$, il existe un intervalle compact $I = I(N,\ell) \subset \mathbb{R}$ (ne dépendant que de ℓ et de N et dont la longueur tend l'infini lorsque ℓ tend vers 0) tel que les N exposants de Lyapounov positifs $\gamma_1(E), \dots, \gamma_N(E)$ de $H_\ell(\omega)$ vérifient*

(2)
$$\forall E \in I, \quad \gamma_1(E) > \cdots > \gamma_N(E) > 0.$$

En particulier, $H_\ell(\omega)$ n'a pas de spectre absolument continu dans I.

3. Principe de la preuve du théorème 2.1

Nous commençons par introduire les matrices de tranfert de l'opérateur $H_\ell(\omega)$. Soit $E \in \mathbb{R}$. La matrice de transfert de ℓn à $\ell(n+1)$ de $H_\ell(\omega)$ est définie par la relation

(3)
$$\begin{pmatrix} u(\ell(n+1)) \\ u'(\ell(n+1)) \end{pmatrix} = T_{\omega^{(n)}}(E) \begin{pmatrix} u(\ell n) \\ u'(\ell n) \end{pmatrix}$$

où $u : \mathbb{R} \to \mathbb{C}^N$ est solution du système différentiel de second ordre $H_\ell(\omega)u = Eu$. On introduit alors pour tout réel E le groupe de Fürstenberg de $H_\ell(\omega)$:

(4)
$$G(E) = \overline{< T_{\omega^{(0)}}(E)|\ \omega^{(0)} \in \mathrm{supp}\,\nu^{\otimes N} >} \supset \overline{< T_{\omega^{(0)}}(E)|\ \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N >}.$$

En vertu d'un théorème dû à Gol'dsheid et Margulis (voir [7, 3]), pour prouver que pour un réel donné E les exposants de Lyapounov sont séparés, il suffit de prouver que $G(E)$ est Zariski-dense dans $\mathrm{Sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})$. En fait nous allons prouver un résultat plus fort.

Proposition 3.1. *Il existe ℓ_C et I comme voulus au théorème 2.1 tels que pour tout $E \in I$, $G(E) = \mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$.*

Pour cela nous utilisons le résultat suivant de théorie des groupes dû à Breuillard et Gelander.

Théorème 3.2 (Breuillard et Gelander, [4])**.** *Si G est un groupe de Lie connexe réel semi-simple, d'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, alors il existe un voisinage de l'identité $\mathcal{O} \subset G$, sur lequel* $\log = \exp^{-1}$ *est un difféomorphisme et tel que $g_1, \dots, g_m \in \mathcal{O}$ engendrent un sous-groupe dense dans G lorsque* $\log(g_1), \dots, \log(g_m)$ *engendrent $\mathfrak{g}$.*

Ce théorème nous donne le plan de la suite de la preuve. Tout d'abord nous allons calculer explicitement les matrices de tranfert $T_{\omega^{(0)}}(E)$ pour $\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N$. Nous prouvons alors qu'il existe $\ell_C > 0$ ne dépendant que de N tel que pour tout $\ell < \ell_C$, $\ell > 0$, il existe un intervalle compact $I(N, \ell)$ de $\mathbb{R}$ tel que pour tout $E \in I(N, \ell)$, $T_{\omega^{(0)}}(E) \in \mathcal{O}$ pour tout $\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N$. Ici, $\mathcal{O}$ est le voisinage de l'identité donné par le théorème 3.2 pour $G = \mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$. Ensuite, pour $\ell < \ell_C$, nous calculons les logarithmes des matrices $T_{\omega^{(0)}}(E)$ et nous prouvons qu'ils engendrent l'algèbre de Lie $\mathfrak{sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})$ de $\mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$.

Nous commençons par donner l'expression des matrices de transfert. Posons

$$M_{\omega^{(0)}}(E) = V_0 + \mathrm{diag}(c_1\omega_1^{(0)} - E, \dots, c_N\omega_N^{(0)} - E). \tag{5}$$

Alors, si on note

$$X_{\omega^{(0)}}(E) = \begin{pmatrix} 0 & I_{\mathrm{N}} \\ M_{\omega^{(0)}}(E) & 0 \end{pmatrix}, \tag{6}$$

on obtient $T_{\omega^{(0)}}(E) = \exp(\ell X_{\omega^{(0)}}(E))$.
Puis, notons $\lambda_1^{\omega^{(0)}}, \dots, \lambda_N^{\omega^{(0)}}$ les valeurs propres réelles de la matrice réelle symétrique $M_{\omega^{(0)}}(0)$. Alors les valeurs propres de $X_{\omega^{(0)}}(E)^t X_{\omega^{(0)}}(E)$ sont 1, $(\lambda_1^{\omega^{(0)}} - E)^2$, …, $(\lambda_N^{\omega^{(0)}} - E)^2$, donc $||X_{\omega^{(0)}}(E)|| = \max(1, \max_{1 \le i \le N} |\lambda_i^{\omega^{(0)}} - E|)$ où $||\ ||$ désigne la norme matricielle induite par la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^{2N}$.
Soit $\mathcal{O}$ le voisinage de l'identité donné par le théorème 3.2 pour $G = \mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$. Alors $\mathcal{O}$ ne dépend que de N. On pose : $\mathrm{d}_{\log \mathcal{O}} = \max\{R > 0 \mid B(0,R) \subset \log \mathcal{O}\}$, où $B(0,R)$ désigne la boule de centre 0 et de rayon $R > 0$ pour la topologie induite par la norme matricielle $||\ ||$ sur l'algèbre de Lie $\mathfrak{sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})$ de $\mathrm{Sp_N}(\mathbb{R})$. On veut trouver un intervalle de valeurs de E telles que :

$$\forall \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N,\ 0 < \ell ||X_{\omega^{(0)}}(E)|| < \mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}, \tag{7}$$

soit encore,

$$0 < \ell \max\left(1, \max_{\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N} \max_{1 \le i \le N} |\lambda_i^{\omega^{(0)}} - E|\right) < \mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}\,. \tag{8}$$

Supposons que $\ell \le \mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}$ et posons $r_\ell = \frac{1}{\ell}\mathrm{d}_{\log \mathcal{O}} \ge 1$. On veut caractériser l'ensemble

$$I_\ell = \left\{ E \in \mathbb{R} \;\middle|\; \max\left(1, \max_{\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N} \max_{1 \le i \le N} |\lambda_i^{\omega^{(0)}} - E|\right) \le r_\ell \right\}. \tag{9}$$

Comme $r_\ell \ge 1$, $I_\ell = \cap_{\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N} \cap_{1 \le i \le N} [\lambda_i^{\omega^{(0)}} - r_\ell, \lambda_i^{\omega^{(0)}} + r_\ell]$. Posons :

$$\lambda_{\min} = \min_{\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N} \min_{1 \le i \le N} \lambda_i^{\omega^{(0)}},\ \lambda_{\max} = \max_{\omega^{(0)} \in \{0,1\}^N} \max_{1 \le i \le N} \lambda_i^{\omega^{(0)}} \text{ et } \delta = \frac{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}{2}. \tag{10}$$

Alors, si $\delta < r_\ell$, $I_\ell = [\lambda_{\max} - r_\ell, \lambda_{\min} + r_\ell]$ et I_ℓ est l'intervalle centré en $\frac{1}{2}(\lambda_{\min} + \lambda_{\max})$ et de longueur $2r_\ell - 2\delta > 0$. De plus, $2r_\ell - 2\delta$ tend vers l'infini lorsque ℓ tend vers 0 et comme $\lambda_{\min}$, $\lambda_{\max}$ et $\mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}$ ne dépendent que de N, I_ℓ ne dépend que de ℓ et de N. La condition $\delta < r_\ell$ est équivalente à $\ell < \frac{\mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}}{\delta} = \ell_C(N)$.
Donc il existe $\ell_C = \frac{\mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}}{\delta}$ tel que pour tout $\ell < \ell_C$, il existe un intervalle compact $I(N,\ell) = [\lambda_{\max} - r_\ell, \lambda_{\min} + r_\ell]$ (ne dépendant que de ℓ et de N et dont la longueur tend vers l'infini lorsque ℓ tend vers 0) tel que :

$$\forall \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N,\ \forall E \in I(N,\ell),\ 0 < \ell ||X_{\omega^{(0)}}(E)|| \leq \mathrm{d}_{\log \mathcal{O}}\,. \tag{11}$$

Alors, pour tout $E \in I(N,\ell)$, $\log T_{\omega^{(0)}}(E) = \ell X_{\omega^{(0)}}(E)$ puisque exp est un difféomorphisme de $\log \mathcal{O}$ sur $\mathcal{O}$. Or, on peut vérifier algébriquement que

$$\forall \ell > 0,\ \forall E \in \mathbb{R},\ \mathrm{Lie}\{\ell X_{\omega^{(0)}}(E) \mid \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N\} = \mathfrak{sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R}) \tag{12}$$

(voir Proposition IV.5.12 dans [5]). Alors, par le théorème 3.2 on obtient :

$$\forall \ell < \ell_C,\ \forall E \in I(N,\ell),\ \overline{< T_{\omega^{(0)}}(E) \mid \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N >} = \mathrm{Sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})\,. \tag{13}$$

Donc, comme $\overline{< T_{\omega^{(0)}}(E) \mid \omega^{(0)} \in \{0,1\}^N >} \subset G(E)$ et $G(E) \subset \mathrm{Sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})$,

$$\forall \ell < \ell_C,\ \forall E \in I(N,\ell),\ G(E) = \mathrm{Sp}_{\mathrm{N}}(\mathbb{R})\,. \tag{14}$$

Cela prouve la séparabilité des exposants de Lyapounov associés à $H_\ell(\omega)$. L'absence de spectre absolument continu pour $H_\ell(\omega)$ dans $I(N,\ell)$ en découle en utilisant la théorie de Kotani et Simon (voir [10, 2]).

Références

[1] H. Boumaza, *Positivity of Lyapunov exponents for a continuous matrix-valued Anderson model*, Math. Phys. Anal. Geom. **10**(2), 97–122 (2007), DOI :10.1007/s11040-007-9023-6

[2] H. Boumaza, *Hölder continuity of the integrated density of states for matrix-valued Anderson models*, Rev. Math. Phys. **20**(7), 873–900 (2008), DOI :10.1142/S0129055X08003456

[3] H. Boumaza and G. Stolz, *Positivity of Lyapunov exponents for Anderson-type models on two coupled strings*, Electron. J. Diff. Eqns. **47**, 1–18 (2007)

[4] E. Breuillard and T. Gelander, *On dense free subgroups of Lie groups*, J. Algebra **261**(2), 448–467 (2003)

[5] R. Carmona and J. Lacroix, *Spectral Theory of Random Schrödinger Operators*, Probability and Its Applications, Birkhäuser, Boston, (1990).

[6] D. Damanik and R. Sims and G. Stolz, *Localization for one-dimensional, continuum, Bernoulli-Anderson models*, Duke Mathematical Journal **114**, 59–99 (2002)

[7] I.Ya. Gol'dsheid and G.A. Margulis, *Lyapunov indices of a product of random matrices*, Russian Math. Survey **44**(5), 11–71 (1989)

[8] A. Klein, *Multiscale analysis and localization of random operators*, arXiv :0708.2292v1 (2007)

[9] A. Klein and J. Lacroix and A. Speis, *Localization for the Anderson model on a Strip with Singular Potentials*, J. Func. Anal. **94**, 135–155 (1990)

[10] S. Kotani and B. Simon, *Stochastic Schrödinger operators and Jacobi Matrices on the Strip*, Commun. Math. Phys. **119**(3), 403–429 (1988)

[11] P. Stollmann, *Caught by Disorder – Bound States in Random Media*, Progress in Mathematical Physics, Vol. **20**, Birkhäuser, (2001)

E-mail address: boumaza@math.jussieu.fr

Keio University, Department of Mathematics, Hiyoshi 3-14-1, Kohoku-ku 223-8522, Yokohama, Japan,